

IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS AO MAPEAMENTO DE TRILHAS ECOTURÍSTICAS, NA PROPRIEDADE DO ECOPARQUE, EM CANELA/RS

KROEFF, Lia Lütz

¹ Mestranda no Programa de Pós Graduação em Geografia/PPGG/UFRJ, E-mail: liakroeff@hotmail.com

VERDUM, Roberto

² Professor Doutor do Departamento de Geografia/IG/UFRGS; verdum@ufrgs.br.

RESUMO

A principal atividade do ecoturismo, a caminhada em trilhas, deveria estar em consonância com os dois preceitos centrais do ecoturismo, ser uma atividade de baixo impacto ambiental e proporcionar aos seus praticantes a experiência e o aprendizado da natureza. Porém, corriqueiramente, as trilhas tornam-se apenas meios de deslocamento mais rápidos a atrativos de grande valor estético, não se aproveitando as potencialidades do ambiente. O objetivo deste trabalho foi elaborar uma proposta metodológica capaz de facilitar a identificação das áreas mais propícias à implantação de trilhas ecoturísticas. O estudo foi desenvolvido em uma área-chave, o Ecoparque, situado na área frontal da Cascata do Caracol, no município de Canela/RS. A definição de unidades de paisagem (UP's) demonstrou ser o método mais adequado para a identificação das áreas mais propícias, por facilitar a identificação das áreas de maior fragilidade ambiental e potencial turístico, e a geomorfologia o critério mais apropriado para a delimitação das unidades. Os levantamentos de campo e o desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) forneceram informações essenciais à caracterização das unidades. Os resultados das análises realizadas permitiram o mapeamento de duas trilhas ecoturísticas.

Palavras chave: trilhas, unidades de paisagem, ecoturismo

ABSTRACT

The main activity in ecotourism, the hiking trails, should be in consonance with the main ecotourism principles, being a low impact activity and providing nature experience and learning. Although usually the trails become only a crosscut to everyday use, instead of a way to activate the most beautiful attractive of the place. The aim of this work was to develop a methodology that would facilitate the identification of the proper location and construction of trails. This methodology should avoid or minimize the tourism impacts, providing the best tourism potential. The study was conducted in the Ecoparque, the front area of Caracol Waterfall, located in the south of Brazil, Canela/RS. The definition of the landscape units seems to be the best method to identify the proper areas to implant the trails. Geomorphology was the most important criteria on the units delimitation, once it helps to identify the most sensitive areas and the areas with most tourism potential. The field data and the GIS development give good information to characterize the units. With the large environmental information analysed it was possible to map two trails.

Key words: trails, landscape units, ecotourism

INTRODUÇÃO

O ecoturismo é o segmento da atividade turística que apresenta atualmente o maior crescimento, o que resulta no incremento das ofertas e demandas por destinos

ecoturísticos. Segundo a *International Ecotourism Society* (TIES¹), o ecoturismo em 2004 já crescia em âmbito global três vezes mais rapidamente do que a indústria do turismo como um todo. O Instituto de Ecoturismo do Brasil (IEB²) estima que o movimento financeiro da atividade tenha quase quadruplicado de 1995 a 2005. De acordo com a definição de Fennel (2002):

O ecoturismo é uma forma sustentável de turismo baseado nos recursos naturais, que focaliza principalmente a experiência e o aprendizado sobre a natureza; é gerido eticamente para manter um baixo impacto, é não-predatório e localmente orientado (controle, benefícios e escala). Ocorre tipicamente em áreas naturais, e deve contribuir para a conservação ou preservação destas (FENNELL, 2002, p. 52-53).

O crescimento do ecoturismo está intimamente ligado aos destinos desta prática. Com o aumento da demanda, proprietários de áreas rurais encaram o ecoturismo como uma alternativa de ganhos financeiros e de utilização da área – muitas vezes restringida pela maior rigidez da legislação ambiental. Costa e Xavier da Silva (2004, p. 67) ressaltam que, da mesma forma, Unidades de Conservação têm aproveitado seu potencial ecoturístico como uma alternativa de viabilidade econômica, a fim de manejar e administrar adequadamente estas áreas. A grande ânsia por ganhos econômicos suscita, muitas vezes, um desleixo do planejamento da atividade. O planejamento teria como objetivo geral avaliar as potencialidades turísticas de um ambiente e minimizar os impactos ambientais da atividade.

Atualmente, uma das principais atividades em ecoturismo é a caminhada em trilhas e suas variantes. Porém, corriqueiramente, as trilhas tornam-se apenas meios de deslocamento mais rápidos a atrativos de grande valor estético, não se aproveitando as potencialidades do ambiente. A trilha ecoturística não é somente um meio de deslocamento, mas o próprio destino da caminhada. As trilhas são uma oportunidade de maior contato com a natureza, de descoberta de novas paisagens e de seus processos ambientais. No entanto, dificilmente as trilhas são implantadas e manejadas de forma a propiciarem aos seus usuários (turistas) o traçado mais seguro e de maior prevenção aos impactos ambientais conjuntamente com a apreciação dos melhores atributos da paisagem.

¹ Disponível em: www.ecotourism.org/, acesso em 20/10/2007.

² Instituto de Ecoturismo do Brasil. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/revista/>, acessado em 20/10/2007.

O planejamento do ecoturismo deveria ter como foco de trabalho a avaliação das potencialidades e das fragilidades ambientais da área analisada, a fim de definir o traçado ideal das trilhas ecoturísticas. Este englobaria as áreas de baixa sensibilidade e de grande potencial turístico, com o propósito dos ecoturistas terem o proveito máximo da área visitada, mas causarem o menor impacto ambiental, uma vez que se buscava conduzi-los aos locais de grande atratividade através de ambientes menos frágeis. Dessa forma, também seria definido as áreas com maior necessidade de preservação, de conservação, preparo de trilha e controle do número de visitantes.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo foi elaborar uma proposta metodológica capaz de facilitar o planejamento de trilhas ecoturísticas, visando o menor impacto ambiental e o maior potencial turístico. A fim de que o objetivo geral fosse atingido, estipulou-se que a metodologia deveria atingir os seguintes objetivos específicos:

- Caracterizar os aspectos ambientais da área de estudo.
- Gerar um Banco de Dados Ambientais (BDA) do Ecoparque, através do uso de Sistema de Informação Geográfica (SIG);
- Definir as unidades de paisagem.
- Avaliar as áreas mais propícias à implantação de trilhas ecoturísticas, mediante a identificação das áreas de fragilidade ambiental e de potencial turístico.
- Determinar os traçados mais adequados das trilhas ecoturísticas.

ÁREA DE ESTUDO

A elaboração desta proposta metodológica se deu em uma área-chave (gleba) situada na área frontal da Cascata do Caracol, principal atrativo turístico do município de Canela/RS. A propriedade se localiza na região turística da Serra Gaúcha, ao norte do estado do Rio Grande do Sul, a aproximadamente 6,5 km ao norte do município. Ela possui cerca de 375 hectares e características ambientais propícias ao desenvolvimento deste estudo, principalmente por ainda não possuir nenhuma trilha ecoturística implantada.

REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL

De simples meio de deslocamento, as trilhas surgem como um novo modo de contato com a natureza; oferecem aos visitantes a oportunidade de desfrutar de uma área de

maneira tranqüila e alcançar maior familiaridade com o ambiente. Além disso, trilhas bem construídas e devidamente mantidas protegem o ambiente do impacto do uso, e também asseguram aos visitantes maior conforto, segurança e satisfação.

Normalmente as trilhas conduzem a um atrativo específico de alta beleza natural. A avaliação da beleza das paisagens é bastante subjetiva, mas alguns autores o fizeram a partir dos seus valores estéticos. Oliveira & Griffith (1987, *apud* FAGUNDES *et al*, 2006) combinaram as variáveis alcance e magnitude da visão (posição do observador), visão de água e qualidade estética dos diferentes tipos de vegetação para avaliar os atrativos do Parque Florestal Estadual do Rio Doce. Conforme destacou Hart (1986, *apud* GUERRA e MARÇAL, 2006, p. 44) “muitas características que fazem de uma paisagem um local atrativo são geomorfológicas”. Guerra e Marçal (2006, p. 44) argumentam que a geomorfologia “pode dar a sua contribuição na avaliação estética de uma determinada porção da superfície terrestre, e isso é de grande apreciação pelo turismo, sendo um dos seus objetivos atrair os visitantes para admirar os diferentes cenários de uma região específica”.

No entanto, muitas vezes para se chegar aos atrativos turísticos, as trilhas passam por áreas de alta fragilidade, por possuírem maior propensão a impactos ambientais. Conforme Spörl (2001), a intensidade dos impactos depende do grau de suscetibilidade à mudança (sensibilidade) do próprio sistema e do esforço (ou tensão) aplicado nele pelo homem. Muitos impactos podem ser reduzidos ou eliminados com o conhecimento dos processos que atuam na área de implantação e uso das trilhas. Ou seja, as áreas de maior sensibilidade ou fragilidade ambiental sofrerão as conseqüências danosas da ação antrópica mais rápida e intensamente.

As áreas sensíveis e principalmente as com potencial turístico serão mais facilmente mapeadas e definidas se estiverem embasadas na prévia compartimentação do terreno. Uma forma de compartimentar o terreno é mediante a definição de unidades de paisagem.


As unidades de paisagem são unidades espaciais definidas por características singulares que as delimitam e as distinguem das outras unidades e permitem a introdução de critérios diferenciados de planejamento/gerenciamento ambiental. As unidades de paisagem podem ser delimitadas por vários critérios, a escolha dependerá dos objetivos do trabalho. Neste estudo, a geomorfologia foi o critério mais importante para a delimitação das unidades,

pois, através da caracterização das formas do relevo, dos processos atuantes, dos fatores controladores e dos materiais componentes, foi possível verificar as áreas de maior fragilidade ambiental e potencial turístico para a instalação das trilhas.

MÉTODOS

A fim de se atingir os objetivos gerais e específicos traçados, desenvolveu-se uma metodologia que tivesse como base o cumprimento dos preceitos do ecoturismo, ser uma atividade de baixo impacto e possibilitar a experiência sobre a natureza, conforme a figura 1 ilustra. Para tanto, foram aplicados métodos de levantamentos de dados em campo e armazenamento – pela criação do SIG (Sistema de Informação Geográfica) – e processamento dos mesmos – mediante técnicas de geoprocessamento que permitiram o cruzamento dos dados e a disponibilização de novas informações. O banco de dados georreferenciado, criado em SIG, foi constantemente realimentado conforme novas informações eram obtidas.

Figura 1: Fluxuograma da Metodologia de Trabalho



O banco de dados criado na etapa I conteve informações sobre a planialtimetria e a hidrografia, as quais, mediante técnicas de geoprocessamento, geraram mapas de hipsometria, declividade e modelo numérico do terreno, MNT, da área de estudo. A compilação e processamento destas informações, aliadas aos demais levantamentos realizados na segunda etapa, em trabalhos de campo, possibilitaram diagnósticos mais apurados da propriedade. Com isso, o banco de dados foi incrementado com informações da forma do relevo, da hidrografia (nascentes) e da pedologia da propriedade, as quais resultaram no mapa das áreas de proteção permanente, APP'S, e no compartimento do relevo em cinco patamares, facilmente perceptíveis pelo declínio da altimetria no sentido nordeste para sudoeste, conforme quadro I.

Quadro 1. Patamares do Relevo

Patamar	Elevação Aproximada	Declividade Aproximada	Características Principais
Patamar 1, Cotas Superiores	790 a 840 metros	0 a 20%	Topo superior do morro
Patamar 2, Morros	760 a 790 metros	0 a 20%	Relevo em processo de dissecção
Patamar 3, Encostas de Vales	711 a 760 metros	20 a 50%	Encostas de vales encaixados
Patamar 4, Fundo de Vales	677 a 711 metros	0 a 20%	Fundo de vales encaixados
Patamar 5, Encostas	410 a 677 metros	30 a 100%	Encosta do vale formado pela dissecção do Arroio Caracol

Fonte: KROEFF, 2007.

Já a análise de satélite de alta resolução QuickBird resultou em informações sobre o uso do solo e cobertura vegetal, as quais foram aprofundadas em campo, com a verificação das espécies vegetais predominantes. As demais informações coletadas em campo diziam respeito a história de ocupação da região e especificamente da propriedade. Também foi feito um diagnóstico turístico regional, a fim de verificar os pontos turísticos principais de Canela e as atividades desenvolvidas em cada um, isso, pois, pretendia-se ao turista uma atividade diferenciada, que envolvesse mais contato com o ambiente e não apenas a contemplação.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

As unidades de paisagem foram delimitadas com base na forma do relevo e nos processos atuantes, pelos patamares 1 e 2 do relevo terem essas características muito semelhantes, esses foram unidos em uma só unidade. Posteriormente, cada unidade foi classificada quanto ao tipo de solo e de vegetação predominante. De acordo com essas informações, foi possível avaliar a potencialidade turística de cada unidade e a fragilidade ambiental – mediante a adaptação da metodologia proposta por Ross (1994) e Donha *et al* (2006), cruzou-se as informações declividade, solos, processos atuantes, áreas de preservação permanente e uso do solo e cobertura vegetal. Desta forma, quatro unidades de paisagem foram definidas, cada qual com características específicas. Conforme o quadro 2 demonstra, as áreas de alto potencial turístico são aquelas onde o campo de visão é amplo, logo, as que proporcionam pontos com vista, fato que está associado à geomorfologia local.

O mapeamento das trilhas ecoturísticas buscou englobar as áreas de elevado potencial turístico e evitar as áreas de alta fragilidade ambiental. Com isso, considerou-se relevante mapear uma trilha de extensão mediana que englobasse as três primeiras unidades de paisagem e uma trilha de curta extensão que explorasse a Unidade de Paisagem 4 - Encostas. A primeira, com aproximadamente 4,6 km, foi denominada de Trilha do Gato Preto por ter como ponto alvo o Morro do Gato Preto; e a segunda, com 2 km de extensão, Trilha dos Mirantes, pelos atrativos principais serem os mirantes para o Vale da Lajeana existentes na UP4. O traçado das duas trilhas é circular a fim de atenuar o impacto de pisoteio, que gera a compactação do solo, e também para buscar manter a atenção do turista durante todo o percurso, uma vez que as atrações não se repetirão.


A Trilha do Gato Preto e a dos Mirantes se encontram em diversos trechos no limite das áreas de alta fragilidade, devido à declividade superior a 30%, e a primeira também das APPs. Conforme evidencia a figura 2, alguns trechos não foram possíveis se evitar, tendo em vista que levam a atrativos importantes, localizados, principalmente, ao longo de drenagens. Em ambas trilhas os trechos de alta fragilidade acompanham horizontalmente as curvas de nível, não cortando a vertente, o que evita a ocorrência de processos erosivos mais expressivos. Ao longo de boa parte do percurso da trilha dos Mirantes o solo possui uma quantidade considerável de serrapilheira – folhas, ramos, raízes e galhos de árvores – o que também contribui para a menor probabilidade de ocorrência de processos erosivos.

Quadro 2. Características das Unidades de Paisagem da Propriedade do Ecoparque

UP	PROCESSOS	SOLO	VEGETAÇÃO	Potenciais Turísticos	Fragilidade Ambiental
UP1 Topos de Morros	Morfogenéticos	Cambissolos húmicos alumínicos	Caracteriza-se pelo maior distanciamento das árvores. Predominantemente vegetação em estado avançado de regeneração, matas de araucária e pinus plantadas.	Contemplação da vista para a região nas cotas mais altas dos morros, mediante instalação de mirantes, e trilhas interpretativas com enfoque para os processos ambientais de regeneração da vegetação – destaque para espécies nativas e plantadas – e histórico de ocupação do uso do solo.	Baixa
UP2 Encostas de Vales	Morfogenéticos	Neossolos litólicos distróficos e Cambissolos húmicos alumínicos	Caracteriza-se pelo menor distanciamento das árvores e maior desordenamento das mesmas. Predominantemente vegetação em estado avançado de regeneração, matas de araucária plantadas.	Contemplação da vista para os vales da propriedade nas áreas mais declivosas e das pequenas quedas d'água e trilhas interpretativas com enfoque para os processos ambientais – destaque para espécies nativas e plantadas – e histórico de ocupação do uso do solo.	Média a Alta
UP3 Fundos de Vales	Pedogenéticos	Latossolos bruno alumínico câmbico	Vegetação característica de ambientes úmidos, grande presença de xaxins.	Contemplação de espécies raras e em extinção, com destaque para os xaxins.	Alta
UP4 Encostas	Morfogenéticos	Neossolos litólicos distróficos	Resquícios de vegetação nativa.	Contemplação da vista para o Vale da Lajeana, atividades de turismo de aventura e trilhas interpretativas com enfoque para os processos ambientais.	Alta

Fonte: KROEFF, 2007

Figura 2: Mapa de Unidades de Paisagem, Fragilidade Ambiental e Trilhas Ecoturísticas



CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição de unidades de paisagem contribuiu fortemente para a definição do melhor traçado das trilhas ecoturísticas, por identificar as áreas de menor fragilidade ambiental e maior potencial turístico, locais mais aconselháveis à localização das trilhas. As áreas mais frágeis, estavam mais sujeitas aos processos morfogenéticos, pela maior declividade e tipo de solo, ou mais suscetíveis aos impactos, pela proximidade dos cursos d'água e de áreas mais úmidas. As unidades de paisagem também facilitaram a identificação das áreas de maior potencialidade turística, uma vez que determinados elementos da paisagem, predominantes em algumas unidades, caracterizam-se pela maior qualidade visual de determinadas áreas.

O traçado das trilhas não conseguiu evitar por completo as áreas de fragilidade ambiental, principalmente por elas coincidirem com as áreas de maior potencial turístico. Porém, o formato circular das trilhas e o acompanhamento das curvas de nível impedirão impactos ambientais mais expressivos. Além disso, ações de mitigação dos impactos causados pelos ecoturistas foram sugeridas, especificamente, para as áreas de maior fragilidade ambiental. De maneira geral, também foram propostas diretrizes genéricas ao manejo estratégico do ecoturismo nas trilhas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA, N. M. C. da. e XAVIER DA SILVA, J. Geoprocessamento Aplicado à Criação de Planos de Manejo: O Caso do Parque Estadual da Pedra Branca-RJ. In: *Geoprocessamento & Análise ambiental: aplicações*/Jorge Xavier da Silva, Ricardo Tavares Zaidan (organizadores). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

DONHA, Annelissa; SOUZA, Luiz C. de P. & SUGAMOSTO, Maria L. Determinação da fragilidade ambiental utilizando técnicas de suporte à decisão e SIG. *R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental*, v.10, n.1, p.175–181, 2006. Disponível em: www.scielo.br/pdf/rbeaa/v10n1/v10n1a26.pdf, acesso em 20/10/2007.

FENNELL, D.A. *Ecoturismo – uma introdução*. São Paulo: Contexto, 2002. 281p.

GUERRA, Antonio José Teixeira e MARÇAL, Mônica dos Santos. *Geomorfologia ambiental*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

IBAMA. IEB - Instituto de Ecoturismo do Brasil. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/revista/apresentação.htm>, acessado 20/10/2007.

KROEFF, Lia Lutz. Planejamento de Trilhas Ecoturísticas na Propriedade do Ecoparque, em Canela/Rs. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Instituto de Geociências, Departamento de Geografia. Trabalho de Graduação em Geografia, 2007.

OLIVEIRA, M. O. & GRIFFITH, J. J. Levantamento dos recursos visuais do Parque Florestal Estadual do Rio Doce. *In: Universidade Federal de Viçosa. Plano Diretor do Parque Florestal Estadual do Rio Doce.* Viçosa: Departamento de Engenharia Florestal/Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, 1987. Vol. 1, p.84-92.

ROSS, J. L. S. Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. *Revista do Departamento de Geografia.* n.8, p.63-74. 1994.

SPÖRL, Christiane. *Análise da fragilidade ambiental relevo-solo com aplicação de três modelos alternativos nas altas bacias do Rio Jaguari-Mirim, Ribeirão do Quartel e Ribeirão da Prata.* Dissertação apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP. São Paulo, 2001. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8135/tde-18012002-225147/>, acesso em 09/07/2007.

The International Ecotourism Society (TIES). Disponível em: www.ecotourism.org/, acesso em 20/10/2007.